



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 4 du 07 Mars 2001 - 1 page

### Grandes Cultures

#### COLZA : Stade D1 - D2

##### Ravageurs

##### Charançon de la tige

Le vol a repris le lundi 05 Mars après midi après une interruption de 12 jours due aux mauvaises conditions climatiques. 150 captures ont été enregistrées à ce jour.

Le vol est de moyenne importance. Les femelles dont la maturation sexuelle a été ralentie la semaine passée vont être rapidement aptes à pondre (températures douces).

*Les parcelles qui n'ont pas encore été protégées, doivent l'être rapidement. Intervenez par temps doux et sans pluie, même en l'absence de soleil.*

##### Meligèthe

Le vol se poursuit timidement, les colzas sont aux stades sensibles et vont le rester jusqu'en F1.

*Votre traitement charançon fera office de traitement mixte charançon-meligèthe. Le traitement spécifique meligèthe sera inutile cette année, vos cultures étant protégées pendant 20 jours.*

##### Pucerons cendrés

De nombreuses parcelles sont touchées par ce ravageur, qui se situe actuellement dans les boutons floraux.

*Observez vos cultures et intervenez avec un aphicide spécifique, si vous avez 1 à 2 foyers au mètre carré.*

#### BLE : Stade mi-tallage à épi 1 cm

##### Piétin verse

Aucune contamination n'est intervenue depuis un mois (températures trop basses...).

Cependant le **risque climatique** reste **élevé** pour les semis antérieurs au 15 Novembre (du même niveau que les 2 années précédentes).

Pour l'appréciation du **risque parcellaire**, les indications de la grille figurant dans le bulletin du 14/02 sont confirmées.

En parcelles à **risque très élevé**, des observations récentes (mais peu nombreuses) mettent en évidence des fréquences d'attaque comprises entre 4 et 10 %.

*\* Intervenir du 15 au 20 Mars dans le cas de la stratégie anti-piétin à base de **prochloraze** seul pour les parcelles à risque parcellaire **élevé** ou **moyen** ayant atteint le stade épi 1 cm à cette période.*

Remarque :

*Les maladies foliaires ne doivent pas être prises en compte lors de l'intervention évoquée ci-dessus.*

*\* Pour les autres situations et les autres stratégies, il est trop tôt pour intervenir (les applications envisagées à base de cyprodinil sont à prévoir vers le stade 1 noeud).*

#### COLZA

##### Charançon de la tige :

Terminer rapidement la protection

##### Pucerons :

A surveiller...

#### BLE

##### Piétin-verse :

Intervention à raisonner

Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
13, route de la Forêt  
86 580 BIARD  
Tél.: 05.49.62.98.25  
Fax: 05.49.62.98.26

Directeur gérant :  
L. JUILLARD-CONDAT

Site internet :  
www.srpv-  
poitoucharentes.com  
E-mail :  
srpv.draf-poitou-  
charentes@agriculture.gouv.fr

Publication périodique  
C.P.P.A.P. n°2139 AD  
ISSN n°02294 470

BnF  
S&T

P160

© SPV Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite du Service Régional de la Protection des Végétaux est formellement interdite.

5340 J 40830